



FICHE TECHNIQUE

HyD FIT

ALIMENT COMPLÉMENTAIRE DIÉTÉTIQUE POUR VOLAILLES

OBJECTIF NUTRITIONNEL

Prévention des déséquilibres nutritionnels dans les régimes de transition.

COMPOSITION

Monopropylène glycol, glycérine.

INDICATION

Recommandé en période de croissance ainsi qu'en période de ponte.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Humidité	96,0%	Cellulose brute	< 0,1 %	Protéines brutes	< 0,1%
Matières grasses brutes	< 0,3 %	Cendres brutes	0,3%	Lysine	< 0,1%
Méthionine	< 0,1%	Sodium	0,16%	3a670a 25-hydroxyxholécalciférol	40,0 mg/kg

TENEUR EN ADDITIF (AU KG)

Vitamines : 3a670a 25-hydroxyxholécalciférol 40 mg/kg (eq 1 600 000 UI D3) - 2b Substances aromatiques : Mélange de produits naturels botaniquement définis: 7960 mg/kg; 2b02078 Ethanol: 2 000 mg/kg
Conservateurs : 1k202 Sorbate de potassium: 4 970 mg/kg

MODE D'EMPLOI

Distribuer dans l'eau pendant 2 à 3 jours consécutifs. **Poulet et dinde** : 1 L/1000 L. **Pondeuse, poulette, pintade et canard à rôtir** : 800 ml/ 1000 L. **Canard prêt à gaver** : 400 ml/1000 L. **Gibier et Caille** : 600 ml/1000 L

Ne pas dépasser par animal et par jour (en ml de produit pur) : **Poulets engraissement standard > 14 jours** : 0,27 ml - **Poulets engraissement standard < 14 jours** : 0,08 ml - **Dindons engraissement mâles medium > 28 jours**, **Dindes reproductrices** : 0,7 ml - **Dindons engraissement medium femelles > 28 jours** : 0,5 ml; **Dindons engraissement medium < 28 jours** : 0,11 ml - **Poules pondeuses** : 0,18 ml - **Poulettes** : 0,1 ml - **Canard à rôtir** : 0,32 ml - **Pintades** : 0,11 ml - **Canards pré gavage** : 0,36 ml - **Cailles** : 0,05 ml - **Perdrix** : 0,06 ml.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Veiller à un bon équilibre de la ration ainsi qu'au bon état de santé des animaux et à leur bon traitement avant l'abattage. Utiliser un système de dosage adapté. La couleur du produit peut varier dans le temps, de blanc à orange, ceci n'a pas d'impact sur l'efficacité du produit.

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

Avant utilisation ou avant prolongation de la période d'utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire. L'utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu'un ou plusieurs d'entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.

CONSERVATION

Tenir à l'abri de la chaleur et de la lumière. DLUO de 12 mois.

PRÉSENTATIONS

Bidon de 1 et 5 litres