# FUMAGRI HA

DÉSINFECTION DES SURFACES PAR VOIE AÉRIENNE. DÉSINFECTANT BACTÉRICIDE - FONGICIDE



## **OBJECTIFS ET INTÉRÊTS**

Traitement de désinfection des surfaces par voie aérienne.

- Locaux d'élevage : désinfection contre *Salmonelles* et autres *Entérobactéries*, *Staphylocoques, Entérocoques, Listeria, Pseudomonas*. Prévention contre les moisissures de genre *Aspergillus*.
- Couvoirs : désinfection contre *Salmonelles* et autres Entérobactéries. Prévention contre les moisissures du genre *Aspergillus*.
  - Désinfection des œufs à couver.

Pas d'exposition de l'applicateur, le produit diffuse de façon autonome.

#### **COMPOSITION**

Acide glycolique (40 g/kg)

## **MODE D'UTILISATION**

<u>Bactéricide/Fongicide à 1 g/m³</u>: Le produit **FUMAGRI HA** va libérer dans le volume à traiter hors présence de tout opérateur, une matière désinfectante (l'acide glycolique) agissant par contact sur les bactéries végétatives, Salmonelles, *Staphylocoques, Entérocoques, Listeria, Pseudomonas*, les levures et les moisissures.

Désignation	Volume d'utilisation
FUMAGRI HA 15 g	15 m <sup>3</sup>
FUMAGRI HA Silo	25 m <sup>3</sup>
FUMAGRI HA 50 g	50 m <sup>3</sup>
FUMAGRI HA 100 g	100 m <sup>3</sup>
FUMAGRI HA 200 g	200 m <sup>3</sup>
FUMAGRI HA 400 g	400 m <sup>3</sup>
FUMAGRI HA 1000 g	1000 m <sup>3</sup>





# **MODE D'UTILISATION**

#### Lors de l'utilisation:

- Couper les alimentations de gaz.
- Déconnecter les cellules photoélectriques.
- Etant donné que le produit génère de la fumée, les système détecteurs de fumée doivent être adaptés pendant l'opération.
- Stopper les ventilations et fermer toutes les issues du local.
- Décompacter la poudre en retournant plusieurs fois la boîte.
- Répartir le nombre de boîtes au sol, sur support résistant à la chaleur.
- Éloigner tout matériau combustible (paille) dans un rayon de 1m50.
- Retirer le couvercle de la boîte et allumer la mèche à l'aide d'un briquet type chalumeau en commençant par la boite la plus éloigné de la sortie.
- Quitter le local en signalant le traitement en cours à tous les accès.
- Maintenir le local clos pendant 4 à 15 heures avant de le réutiliser.
- Ventiler les locaux en tout air neuf pendant 30 min à 1 heure.
- Respecter un intervalle de 24 heures entre deux applications.

#### RÉGLEMENTAIRE

 Usage Biocide (Type Produit 3 et Type Produit 4): Désinfection bactéricide, fongicides et levuricide.

TP03: Locaux et matériel élevage, matériel de transport d'animaux domestiques.

TP04 : Locaux et matériel de stockage, matériel de transport d'aliments, locaux et matériel de production.

Usage professionnel

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Toujours lire l'étiquette, la fiche de sécurité et toute autre information sur le produit avant utilisation.

Lors de l'utilisation du FUMAGRI HA il est indispensable de revêtir les équipements de protection EPI adaptés.



Combinaison chimique type 4 à usage unique.



Gants nitrile EN 374 (à changer tous les 5 ans ou des l'apparition de signes d'usures)



Masque-complet ou demi masques avec les cartouches ABEK P



Bougie

15 g

HA silo
25 m³

50 g



100 a