



DÉSINFECTANT DE RÉFÉRENCE À LARGE SPECTRE POUR LES ÉLEVAGES.

B	V	F
0,25 %	0,5%	1 %

Produit
Sélectionné par
GEOSANE



OBJECTIFS ET INTÉRÊTS

Désinfectant à large spectre pour les bâtiments d'élevage (bactéricide, fongicide et virucide)

- **Efficacité** sur plus de 50 souches de microorganismes (*Liste exhaustive disponible sur demande*)
- **Stable et Efficace** quelles que soient les conditions de températures froides ou chaudes
- **Mousse Adhérente** sur différents types de supports (brique, bois, acier etc)
- **Biodégradable à 82 %** pour une meilleure protection de l'environnement

COMPOSITION

TH5 est une formulation liquide exclusive associant un ammonium quaternaire et du glutaraldéhyde:

- Chlorure d'Alkyl dimethyl benzyl Ammonium - 32,75%
- Glutaraldéhyde - 10 %
- Excipients: tensio-actifs, q.s.p

MODE D'UTILISATION

Appliquer TH5 :

- En pulvérisation sous forme liquide ou de mousse, diluer **TH5** à 1 %.



Tableau de dosage pour la désinfection des surfaces en volaille chair

Surface au sol	Type de sol	Vol. d'eau	Vol. de TH5 à 1%
1000 m ²	Terre Battue	450 litres	4,5 litres
1000 m ²	Béton	750 litres	7,5 litres



Tableau de dosage pour la désinfection des surfaces en porc

Nombre de places	Surface dev.	Vol. d'eau	Vol. de TH5 à 1%
Maternité : 10	240 m ²	72 litres	0,72 litres
Post-Sevrage : 100	150 m ²	45 litres	0,45 litres
Engraissement : 100	300 m ²	90 litres	0,9 litres



MODE D'UTILISATION

- En nébulisation: prévoir une dose de **TH5** 2.5 ml/m³ dilué à 50% avec de l'eau ou de l'adjuvant.
- En thermonébulisation: prévoir une dose de **TH5** 1 ml / m³ dilué à 50% avec de l'eau ou de l'adjuvant.



Tableau de dosage pour la désinfection par thermonébulisation

Bâtiment de 1000 m ² au sol	Volume d'air	Volume d'eau	Vol. TH5 (1ml / m ³)
Terre battue et béton	3500 m ³	3,5 litres	3,5 litres

Autres Utilisations:

- En pédiluves/rotoluves : diluer **TH5** à 1%. Renouveler la solution tous les 2 à 4 jours.
- En trempage : diluer **TH5** à 1%

RÉGLEMENTAIRE

TP3 Homologué pour la désinfection des logements des animaux, matériels de transport d'élevage
TP4 pour la désinfection des surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

PRÉCAUTIONS EN ÉLEVAGE

Attendre le séchage complet du bâtiment avant le retour des animaux (24 à 48 heures). Rincer le matériel à l'eau après utilisation.

Le rinçage à l'eau est obligatoire pour toute surface en contact avec des denrées alimentaires.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Toujours lire l'étiquette, la fiche de sécurité et toute autre information sur le produit avant utilisation.
Lors de l'utilisation de **TH5**, il est indispensable de revêtir les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés:



Combinaison chimique type 4 à usage unique.



Gants nitrile EN 374 (à changer tous les 5 ans ou dès l'apparition de signes d'usures)



Masque-complet ou demi-masques avec les cartouches ABEK P



Lunettes de protection



Bidon



Fût